

TABELA WYPEŁNIACZY

NAZWA	Co zawiera	Działanie	Gdzie się podaje	Trwałość efektów	Dostępność w Polsce	Zalety	Wady	Okres rekonwalescencji	Reakcje uboczne
Przeszczep własnej tkanki tłuszczowej. Więcej informacji na stronie w sekcji powiększanie ust	Własna tkanka tłuszczowa pobrana z miejsc gdzie występuje w nadmiarze np. uda, brzuch, poślądki ust	Wypełniacz tkankowy, nie może być podawany śródskórnymie tj. bezpośrednio w zmarszczki	Fałdy nosowo-wargowe, bruzda między brwiami, wargi okolice jarzmowe, bródka	Zależy od techniki przygotowania i podania, średnio 3-6 miesięcy maks. 1 rok	Jako własna tkanka nie wymaga żadnych zezwoleń ani atestów	Bezpieczny i łatwy w użyciu, brak reakcji ubocznych ze strony organizmu	Niezbędne trwałe efekty, konieczność pobrania z innego miejsca ciała, niedostępność u szczupłych osób	Po małych zabiegach np. same wargi 1-3 dni, po dużych zabiegach 7-10 dni	BRAK
Zyderm Zyplast Resoplast	Wysoko oczyszczony kolagen bydłocy	Wypełniacz tkankowy	Zmarszczki, fałdy nosowo-wargowe, wargi, bruzda między brwiami	Zależnie od preparatu i podanej ilości od 3 do 6 miesięcy	Dopuszczony do stosowania, posiada również atest FDA	Dobrze poznany, łatwy w stosowaniu, nie wymaga znieczulenia	Wymaga próby uczuleniowej na 1 m-c przed zabiegiem, niezbyt trwały efekt, możliwe reakcje uboczne	BRAK	Odczyny uczuleniowe mimo ujemnej próby, czasami widoczne grudki w miejscu podania
Botox Dysport Myoblock	Botulina toksyna produkowana przez pałeczkę jadu kiełbasianego	Nie jest wypełniaczem tkankowym, powoduje przejściowe porażenie mięśni mimicznych	Zmarszczki mimiczne czoła, kurze łapki, bruzdy między brwiami, szyja	W zależności od dawki 6-12 miesięcy	Dopuszczony do stosowania, posiada również atest FDA	Łatwy i szybki w użyciu, nie wymaga rekonwalescencji, brak reakcji uczuleniowych	Może powodować opadanie brwi lub powiek oraz asymetrię twarzy przy nieprecyzyjnym podaniu, trudny w przechowaniu	BRAK	Zasinienie lub zaczerwienienie w miejscu podania, bóle głowy, przejściowe objawy grypopodobne, możliwość opadania powieki lub brwi
Aquamid Więcej informacji na www.pad	5% poliakrylamid 95% woda	Wypełniacz tkankowy, nie może być podawany śródskórnymie tj. bezpośrednio w zmarszczki	Fałdy nosowo-wargowe, bruzda między brwiami, wargi okolice jarzmowe, bródka	Trwały wynik, nie ulega wchłonięciu lub bio-degradacji	Dopuszczony do użytku, posiada atest CE	Trwały, łatwy w użyciu nie wymaga znieczulenia ogólnego, nie wymaga rekonwalescencji	Praktycznie nie możliwy do usunięcia, względnie krótki okres obserwacji w porównaniu z innymi wypełniaczami	BRAK	Bardzo rzadkie przejściowy obrzęk i bolesność w miejscu podania, możliwość przemieszczenia się pod wpływem ucisku
Alloderm	Pozbawiona komórek ludzka skóra ze zwłok	Wypełniacz tkankowy, dostępny zarówno w formie płynnej (zastrzyki) jak i stałej	Zależy od postaci: postać płynna tak jak kolagen, forma stała wargi, rowki nosowo-wargowe	Trwały wynik, nie ulega wchłonięciu ani bio-degradacji	Dopuszczony do stosowania, posiada również atest FDA	Brak reakcji uczuleniowych	Wysoka cena, stosunkowo trudny w użyciu	Ok. 5 dni	Możliwość infekcji w miejscu implantacji
Gore-Tex SoftForm	Porowaty politetrafluoroetylen (teflon)	Implant tkankowy dostępny tylko w postaci stałej	Wargi, rowki nosowo-wargowe, grzbiet nosa okolice jarzmowe, bródka	Trwały wynik, nie ulega wchłonięciu ani bio-degradacji	Dopuszczony do stosowania, posiada również atest FDA	Możliwość łatwego usunięcia w razie potrzeby, brak reakcji uczuleniowych i immunologicznych	Trudny w użyciu, ze względu na konsystencję może być widoczny lub wyczuwalny pod skórą	Po małych zabiegach np. same wargi 1-3 dni, po dużych zabiegach 7-10 dni	Możliwość infekcji w miejscu wszczepienia, możliwość późnej reakcji ze strony organizmu prowadzącej do konieczności jego usunięcia
Restylan	Kwas hialuronowy pochodzenia ludzkiego	Wypełniacz tkankowy	Zmarszczki, fałdy nosowo-wargowe, wargi	Powyżej 6 miesięcy, ok. 66% pierwotnego efektu po upływie roku	Dopuszczony do stosowania, posiada również atest FDA	Nie wymaga testów uczuleniowych łatwy w użyciu nie wymaga znieczulenia ogólnego	Możliwość wystąpienia odczynu ze strony tkanek	BRAK	Zaczerwienienie, obrzęk, tkliwość w miejscu podania
Hylaform Hylan B	Kwas hialuronowy pochodzenia zwierzęcego	Wypełniacz tkankowy	Zmarszczki, fałdy nosowo-wargowe, wargi	3-6 miesięcy	Na razie nie dostępny w Polsce, atest FDA w trakcie procesu legalizacji	Łatwy w użyciu nie wymaga znieczulenia ogólnego	Konieczność wykonania próby uczuleniowej, możliwość wystąpienia odczynu ze strony tkanek	BRAK	Zaczerwienienie, obrzęk, tkliwość w miejscu podania, ok. 2% reakcji uczuleniowych
Artecoll Artefill	Zawiesina polimetylo-metakrylanu (plexiglass) w kolagenie bydłocym	Wypełniacz tkankowy	Zmarszczki, fałdy nosowo-wargowe, wargi, okolice międzybrwio-wa	Nie ulega wchłonięciu ani biodegradacji. Długotrwały efekt (semipermanentny) 64% pierwotnego efektu po upływie 2 lat	Dopuszczony do stosowania w Polsce, oczekuje na atest FDA	Długotrwały efekt, łatwy w użyciu, mało reaktywny bardzo rzadkie odczyny tkankowe	Konieczność wykonania próby uczuleniowej na kolagen, przeciwwskazany u pacjentek z cienką skórą, możliwość wystąpienia odczynu ze strony tkanek, praktycznie nie możliwy do usunięcia	BRAK	Wyczuwalne lub widoczne stwardnienia lub zbliżowacenia w skórze, ziarninaki
Radiance	Syntetyczna postać hydroksypa-tytu (materiału budulcowego kości)	Wypełniacz tkankowy	Zmarszczki, fałdy nosowo-wargowe, wargi, okolice międzybrwio-wa	Nie ulega wchłonięciu Długotrwały efekt, co najmniej 2 lata	Niedostępny w Polsce, nie ma atestu FDA do użytku kosmetycznego	Długotrwały efekt, nie wywołuje odczynów uczuleniowych nie wymaga próby uczuleniowej	Bardzo trudny do usunięcia, krótki okres obserwacji wyników po użyciu do celów kosmetycznych	BRAK	Zaczerwienienie, obrzęk, niekiedy wyczuwalne stwardnienia w miejscu podania
Cosmodern Cosmoplast	Kolagen ludzki ze skóry zwłok	Wypełniacz tkankowy	Zmarszczki, fałdy nosowo-wargowe, wargi, bruzda między brwiami	Do 6 miesięcy	Niedostępny w Polsce, posiada atest FDA	Łatwy w użyciu, nie wymaga próby uczuleniowej	Krótkotrwały efekt, wysoka cena	BRAK	Zaczerwienienie, obrzęk w miejscu podania
Cymetra	Mikronizowana skóra ze zwłok	Wypełniacz tkankowy	Zmarszczki, fałdy nosowo-wargowe, wargi, bruzda między brwiami	2-3 miesiące	Niedostępna w Polsce, posiada atest FDA	Łatwa w użyciu, nie wymaga próby uczuleniowej	Bardzo krótkotrwały efekt, bolesna przy wstrzykiwaniu wysoka cena	BRAK	Zaczerwienienie, obrzęk w miejscu podania
Fascian	Powięź mięśnia napinacza powiezi szerokiej ze zwłok	Wypełniacz tkankowy	Bruzda między brwiami, rowki nosowo-wargowe, wargi	3-4 miesiące	Niedostępna w Polsce, posiada atest FDA	Łatwy w użyciu, nie wymaga próby uczuleniowej	Krótki okres obserwacji	BRAK	Możliwość wystąpienia stwardnień w miejscu podania
Dermalogen	Kolagen ludzki ze skóry zwłok	Wypełniacz tkankowy	Zmarszczki, fałdy nosowo-wargowe, wargi, bruzda między brwiami	3-4 miesiące	Niedostępna w Polsce, posiada atest FDA	Łatwy w użyciu, nie wymaga próby uczuleniowej	Bardzo krótkotrwały efekt, bolesny przy wstrzykiwaniu wysoka cena	BRAK	Zaczerwienienie, obrzęk w miejscu podania
Autologen Isologen	Własnopochodny kolagen, wytwarzany ze skóry pacjenta	Wypełniacz tkankowy	Zmarszczki, fałdy nosowo-wargowe, wargi, bruzda między brwiami	Ok. 6 miesięcy	Jako własna tkanka nie wymaga żadnych zezwoleń ani atestów, technologia nie dostępna w Polsce	Bezpieczny w użyciu, brak reakcji ubocznych ze strony organizmu	Horrendalna cena	BRAK	BRAK